L'HÉPATITE C AU CANADA : LES MÉDECINS DE SOINS PRIMAIRES SONT LE 1ER POINT DE DÉPISTAGE

POURQUOI DÉPISTER L'HÉPATITE C?

L'hépatite C est une maladie du foie qui peut progresser jusqu'à la cirrhose, le cancer du foie et qui peut finalement se terminer en décès induit par une insuffisance hépatique.

De nouveaux traitements efficaces sont disponibles!

Faites des tests de dépistage pour une détection et une intervention précoces.



250 000 à 400 000 CANADIENS SONT ATTEINTS DE L'**HÉPATITE C**[1]

NÉS ENTRE 1945 - 1975

>75%[2]

44% NE SAVENT MÊME PAS QU'ILS EN SONT INFECTÉS[1]

RECONNAÎTRE • Qui doit passer un test de dépistage

LE DÉPISTAGE BASÉ SUR LE RISQUE **EN LUI-MÊME** EST **INEFFICACE**

DÉPISTAGE BASÉ SUR LE RISQUE :

A) Consommation de drogues injectables ou intranasales illicites, ou partage d'accessoires destinés à l'utilisation de drogues (dans le passé ou dans le présent)
B) Né ou résidant dans une région où l'hépatite C est plus répandue (c.-à-d. Asie Centrale, de l'Est ou du Sud; Australasie et Océanie; Europe orientale; Afrique subsaharienne; Afrique du Nord/Moyen-Orient)
C) Sang, produits sanguins ou transplantation d'organe avant juillet 1990 au Canada
D) Piqûre d'aiguille présentant du sang séropositif pour l'hépatite C
E) Signes d'une maladie du foie (c.-à-d. analyses des enzymes du foie anormales) ou autres maladies infectieuses (c.-à-d. hépatite B, VIH, etc.)
F) Traitement rénal/hémodialyse
G) Enfants nés de mères infectées par le virus de l'hépatite C
H) Tatouages ou perçages corporels
I) Pratiques sexuelles à risque (c.-à-d. plusieurs partenaires, relations sexuelles traumatiques ou brutales, etc.)
J) Le partage de produits de soins personnels avec une personne atteinte d'hépatite C (c.-à-d. rasoirs, brosse à dents, etc.)

LA FONDATION CANADIENNE DU FOIE RECOMMANDE D'**AJOUTER** LE **DÉPISTAGE EN FONCTION DE LA COHORTE DE NAISSANCE**[3]

1

RÉPONDRE • Comment tester

TEST DES ANTICORPS DU VHC
(détecte les anticorps de l'hépatite C dans le sang)

TEST DE L'ARN DU VHC
(détecte le virus de l'hépatite C dans le sang)

2

RÉSOUDRE • Que faire après le dépistage

RECOMMANDATION POUR SOINS ET TRAITEMENT



Référez le patient à votre spécialiste habituel ou cherchez un spécialiste dans vos environs au www.liver.ca/medecindufoie

ÉVALUATION/SURVEILLANCE

Faites un suivi avec des analyses supplémentaires selon les résultats des tests décrits ci-dessus.

Faites des tests de dépistage pour déceler des troubles mentaux ou des troubles liés à la toxicomanie, et si nécessaire, traiter ou référer de façon appropriée. Des troubles mentaux ou troubles liés à la toxicomanie évolutifs ne devraient pas exclure les patients d'une recommandation immédiate à des fins de traitement.

3

www.liver.ca/HepC4HCP-FR

1. Trubnikov, M., P.Yan, and C. Archibald. Estimated prevalence of Hepatitis C virus infection in Canada, 2011. Canada Communicable Disease Report 40.19 (2014): 429
2. Remis RS. Modelling the incidence and prevalence of hepatitis C infection and its sequelae in Canada, 2007. Ottawa (ON): Public Health Agency of Canada; 2007
3. http://liver.ca/support-liver-foundation/advocate/clf-position-statements/hepatitis_C_testing.aspx

foie.ca
Fondation canadienne du foie
Canadian Liver Foundation